

Додаток 3

до Методичних рекомендацій розрахунку кількості (запасу) засобів індивідуального захисту необхідних для забезпечення медичних працівників в період спалаху інфекційних хвороб із невизначеними шляхами передавання та інфікування  
(пункт 3 розділу III)

**Приклад розрахунку потреби для закладів охорони здоров'я в засобах індивідуального захисту на одного члена команди (бригади) на добу**

Роль в команді/бригаді	Одноразові ЗІЗ <sup>1</sup>										Багаторазові ЗІЗ
	Ізоляційний халат	Костюм біозахисту	Рукавички із довгими манжетами нетальковані нитрилові	Рукавички нетальковані нитрилові	Бахіли	Фартух медичний	Респіратор класу захисту FFP2	Респіратор класу захисту FFP3	Шапочка медична <sup>2</sup>	Маска хірургічна (медична)	Захисний щиток
Медична сестра/брат	2	2	12	4	4	2	8	2	5	0	2
Лікар	1	1	2	2	2	1	5	1	1	0	1
Член КІК	2	0	2	2	2	0	0	0	0	2	2
Молодший медичний персонал	2	2	12	12	12	2	5	1	4	0	2
Персонал лабораторії	2	2	4	4	4	2	0	5	2	0	2
<b>Всього</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>32</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>9</b>

<sup>1</sup> кількість необхідних ЗІЗ на зміну може змінюватися в залежності від багатьох факторів, включно із тяжкістю стану пацієнта, тривалістю зміни, перерв і т.д. Розрахунок в таблиці проводиться на зміни, які працюють від 3 до 4 годин (наприклад, перша команда (бригада) працює 3 години, її змінює друга команда (бригада), яка також працює 3 години; далі працює перша команда (бригада) 3 години і т.д.; команда (бригада) не повинна працювати більше 12 годин на добу; після відпрацювання 12 годин у команди (бригади) має бути вихідний тривалістю мінімум 48 годин).

<sup>2</sup> медичну шапочку одноразову слід одягати при ризику потрапляння біологічних рідин (в першу чергу виділень з верхніх дихальних шляхів) на шкіру голови та волосся (наприклад, при догляді за хворим із вираженим кашлем).