

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров'я
України

від 16.07.2020 № 1618

**Зведені показники 100 % потреби лікарських засобів та медичних виробів,
що закуповуються на підставі угод щодо закупівлі із спеціалізованими
організаціями, які здійснюють закупівлі, за напрямом використання
бюджетних коштів у 2020 році за бюджетною програмою КПКВК 2301400
«Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та
комплексних заходів програмного характеру»**

**Медикаменти та медичні вироби для хворих у до- та післяопераційний
період з трансплантації**

Медикаменти для хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Орієнтовний обсяг потреби, 100 відсотків	Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування
Такролімус	таблетки, капсули	0,5 мг	86645	72699
Такролімус	таблетки продовженої дії, капсули продовженої дії	0,5 мг	249793	209600
Такролімус	таблетки, капсули	1 мг	772627	648330
Такролімус	таблетки продовженої дії, капсули продовженої дії	1 мг	1271733	1067153
Такролімус	—“—	3 мг	124630	104576
Такролімус	таблетки, капсули	5 мг	9572	8028
Такролімус	таблетки	5 мг	17896	15012

	продовженої дії, капсули продовженої дії			
Циклоспорин	таблетки, капсули	25 мг	639047	536237
Циклоспорин	—“—	50 мг	409150	343323
Циклоспорин	—“—	100 мг	111488	93543
Мікофенолова кислота та її солі (натрію мікофенолат)	—“—	180 мг	3083957	2587861
Мофетіла мікофенолат	—“—	250 мг	721836	605715
Базиліксімаб	ампули, флакони, шприц-тюбик	20 мг	0	0
Еверолімус	таблетки, капсули	0,75 мг	61135	51292
Імуноглобулін проти тимоцитів кролячий	ампули, флакони, шприц-тюбик	25 мг	326	273
Азатіопрін	таблетки, капсули	50 мг	35044	29401
Валганцикловір	—“—	450 мг	81427	68319

Для дітей до 5 років

Такролімус	гранули для оральної суспензії	0,2 мг	2190	1838
Такролімус	—“—	1 мг	9125	7658

Циклоспорин	розчин оральний у флаконі разом з дозувальним комплектом у коробці з картону пакувального	100 мг/мл по 50 мл у флаконі	0	0
Мофетіла мікофенолат	суспензія для перорального прийому у флаконі	1 г/5 мл по 110 г у флаконі	730	612

*Медичні вироби для хворих у до- та післяопераційний
період з трансплантації*

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Орієнто вний обсяг потреби, 100 відсоткі в	Орієнто вна кількіст ь з урахува нням обсягу фінансу вання
Діагностичні набори для визначення концентрації циклоспорину А	наборів	38	32
Діагностичні набори для визначення концентрації такролімусу	—“—	32	27

*Витратні матеріали для гемодіалізу у хворих, які готуються до
трансплантації (комплект для діалізу з діалізатором, кровопровідними
магістралями та комплектом фістульних голок)*

Діалізатор площею 1,3—1,6 м ² до апаратів типу “Фрезеніус	комплектів	48	39
---	------------	----	----

5008", або еквівалент			
Діалізатор площею 1,3—1,6 м ² до апаратів типу Gambro Innova, або еквівалент	—“—	0	0
Діалізатор площею 1,7—2 м ² до апаратів типу “Фрезеніус 5008”, або еквівалент	—“—	30	25
Діалізатор площею 1,7—2 м ² до апаратів типу Gambro Innova, або еквівалент	—“—	16	14

Лікарські засоби та медичні вироби для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання

Лабораторні реагенти для визначення рівня метотрексату та циклоспорину, сумісні з приладом Architect i1000sr

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Орієнтовний обсяг потреби, 100 відсотків	Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування
ARCHITECT Methotrexate Reagent Kit, набір реагентів, 100 тестів, або еквівалент	наборів	42	42
ARCHITECT Methotrexate Calibrators, калібратори, 6 флаконів по 4 мл, або еквівалент	—“—	13	13
ARCHITECT Multi-Assay Manual Diluent, універсальний	флаконів	61	61

розчинник для ручного розведення, 100 мл, або еквівалент			
ARCHITECT Methotrexate Controls, контролю, 4 флакони по 8 мл, або еквівалент	наборів	14	14
ARCHITECT Concentrated Wash Buffer, промивний буфер, 4 флакони по 975 мл, або еквівалент	упаковок	84	84
ARCHITECT Pre-Trigger Solution, претригерний розчин, 4 флакони по 975 мл, або еквівалент	—“—	57	57
ARCHITECT Trigger Solution, тригерний розчин, 4 флакони по 975 мл, або еквівалент	—“—	57	57
ARCHITECT Probe Conditioning Solution, розчин, 4 флакони по 25 мл, або еквівалент	—“—	12	12
ARCHITECT Septum, мембрана, 200 штук, або еквівалент	—“—	17	17
ARCHITECT Replacement Caps, змінні кришки, 100 штук, або еквівалент	—“—	17	17
ARCHITECT Sample Cups, чашки для зразків, 1000 штук, або еквівалент	—“—	19	19
ARCHITECT Reaction Vessels, реакційні ємності, 4000 штук, або еквівалент	—“—	19	19

ARCHITECT Cyclosporine Reagent Kit, набір реагентів, 100 тестів, або еквівалент	наборів	16	16
ARCHITECT Cyclosporine Calibrators, калібратори, або еквівалент	—“—	6	6
ARCHITECT Cyclosporine Whole Blood Precipitation Reagent Kit, набір реагентів, або еквівалент	наборів	6	6
Multichem WBT, контролю, або еквівалент	—“—	5	5

Лабораторні реагенти та витратні матеріали

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Орієнтовний обсяг потреби, 100 відсотків	Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування
------------------------	----------------	--	--

Реагенти та витратні матеріали для імунофенотипування біологічних зразків методом проточної цитофлюориметрії

Моноклональне антитіло CD1a, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	тестів	250	250
Моноклональне антитіло CD2, мічене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—“—	233	233

Моноклональне антитіло CD2, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент	—“—	0	0
Моноклональне антитіло CD3, мічене флюоресцентним барвником APC-Alexa Fluor 750 або APC-H7, або еквівалент	—“—	700	700
Моноклональне антитіло CD3, мічене флюоресцентним барвником ECD або PE-Texas Red, або PE-CF594, або еквівалент	—“—	1533	1533
Моноклональне антитіло CD3, мічене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—“—	933	933
Моноклональне антитіло CD3, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент	—“—	267	267
Моноклональне антитіло CD3, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy7, або еквівалент	—“—	300	300
Моноклональне антитіло CD4, мічене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—“—	67	67
Моноклональне антитіло CD4, мічене флюоресцентним барвником Pacific Blue, або еквівалент	—“—	100	100
Моноклональне антитіло CD4, мічене флюоресцентним	тестів	400	400

барвником PE, або еквівалент			
Моноклональне антитіло CD4, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент	—“—	33	33
Моноклональне антитіло CD5, мічене флюоресцентним барвником APC-Alexa Fluor 700, або еквівалент	—“—	100	100
Моноклональне антитіло CD5, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	267	267
Моноклональне антитіло CD5, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент	—“—	200	200
Моноклональне антитіло CD5, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5.5, або PerCP-Cy5.5, або еквівалент	—“—	100	100
Моноклональне антитіло CD7, мічене флюоресцентним барвником APC або Alexa Fluor 647, або еквівалент	—“—	400	400
Моноклональне антитіло CD7, мічене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—“—	200	200
Моноклональне антитіло CD7, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	100	100
Моноклональне антитіло CD8, мічене флюоресцентним барвником APC-Alexa Fluor	—“—	100	100

700, або еквівалент			
Моноклональне антитіло CD8, мічене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—“—	67	67
Моноклональне антитіло CD8, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	0	0
Моноклональне антитіло CD8, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент	—“—	100	100
Моноклональне антитіло CD8, мічене флюоресцентним барвником APC або Alexa Fluor 647, або еквівалент	тестів	67	67
Моноклональне антитіло CD9, мічене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—“—	267	267
Моноклональне антитіло CD10, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	367	367
Моноклональне антитіло CD10, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент	—“—	300	300
Моноклональне антитіло CD10, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5.5 або PerCP-Cy5.5, або еквівалент	—“—	300	300
Моноклональне антитіло CD10, мічене флюоресцентним	—“—	400	400

барвником PE-Cy7, або еквівалент			
Моноклональне антитіло CD11a, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	50	50
Моноклональне антитіло CD11b, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	200	200
Моноклональне антитіло CD11c, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	450	450
Моноклональне антитіло CD13, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	333	333
Моноклональне антитіло CD14, мічене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—“—	234	234
Моноклональне антитіло CD14, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	233	233
Моноклональне антитіло CD15, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент	—“—	700	700
Моноклональне антитіло CD15, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	тестів	67	67
Моноклональне антитіло CD16, мічене флюоресцентним	—“—	67	67

барвником FITC, або Alexa Fluor 488, або еквівалент			
Моноклональне антитіло CD16, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	133	133
Моноклональне антитіло CD19, мічене флюоресцентним барвником ECD або PE-Texas Red, або PE-CF594, або еквівалент	—“—	1266	1266
Моноклональне антитіло CD19, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент	—“—	466	466
Моноклональне антитіло CD19, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy7, або еквівалент	—“—	300	300
Моноклональне антитіло CD20, мічене флюоресцентним барвником APC-Alexa Fluor 700, або еквівалент	—“—	100	100
Моноклональне антитіло CD20, мічене флюоресцентним барвником APC-Alexa Fluor 750 або APC-H7, або еквівалент	—“—	100	100
Моноклональне антитіло CD20, мічене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—“—	400	400
Моноклональне антитіло CD20, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5.5	—“—	200	200

або PerCP-Cy5.5, або еквівалент			
Моноклональне антитіло CD22, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	200	200
Моноклональне антитіло CD24, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	317	317
Моноклональне антитіло CD30, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	250	250
Моноклональне антитіло CD33, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент	тестів	400	400
Моноклональне антитіло CD34, мічене флюоресцентним барвником APC або Alexa Fluor 647, або еквівалент	—“—	800	800
Моноклональне антитіло CD34, мічене флюоресцентним барвником ECD, PE-Texas Red, PE-CF594, або еквівалент	—“—	700	700
Моноклональне антитіло CD34, мічене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—“—	1000	1000
Моноклональне антитіло CD34, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	1799	1799

Моноклональне антитіло CD34, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент	—“—	1000	1000
Моноклональне антитіло CD38, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	200	200
Моноклональне антитіло CD38, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент	—“—	333	333
Моноклональне антитіло CD38, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5.5 або PerCP-Cy5.5, або еквівалент	—“—	200	200
Моноклональне антитіло CD41, мічене флюоресцентним барвником FITC, Alexa Fluor 488, або еквівалент	—“—	200	200
Моноклональне антитіло CD42a, мічене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—“—	0	0
Моноклональне антитіло CD42b, мічене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—“—	133	133
Моноклональне антитіло CD44, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	0	0
Моноклональне антитіло CD45, мічене флюоресцентним	тестів	1033	1033

барвником APC, або Alexa Fluor 647, або еквівалент			
Моноклональне антитіло CD45, мічене флюоресцентним барвником APC-Alexa Fluor 700, або еквівалент	—“—	800	800
Моноклональне антитіло CD45, мічене флюоресцентним барвником APC-Alexa Fluor 750, або APC-H7, або еквівалент	—“—	700	700
Моноклональне антитіло CD45, мічене флюоресцентним барвником ECD, PE-Texas Red, PE-CF594, або еквівалент	—“—	333	333
Моноклональне антитіло CD45, мічене флюоресцентним барвником Krome Orange, або Brilliant Violet 510, або еквівалент	—“—	100	100
Моноклональне антитіло CD45, мічене флюоресцентним барвником Pacific Blue, або еквівалент	—“—	100	100
Моноклональне антитіло CD45, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент	—“—	300	300
Моноклональне антитіло CD45, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy7, або еквівалент	—“—	700	700
Моноклональне антитіло CD48, мічене флюоресцентним барвником ECD, або PE-Texas Red, або PE-CF594,	—“—	200	200

або еквівалент			
Моноклональне антитіло CD56, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	4000	4000
Моноклональне антитіло CD56, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент	—“—	266	266
Моноклональне антитіло CD57, мічене флюоресцентним барвником FITC, або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—“—	67	67
Моноклональне антитіло CD58, мічене флюоресцентним барвником APC, або Alexa Fluor 647, або еквівалент	—“—	200	200
Моноклональне антитіло CD58, мічене флюоресцентним барвником FITC, або Alexa Fluor 488, або еквівалент	тестів	67	67
Моноклональне антитіло CD59, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	0	0
Моноклональне антитіло CD61, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	23	23
Моноклональне антитіло CD64, мічене флюоресцентним барвником FITC, або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—“—	167	167
Моноклональне антитіло CD65, мічене флюоресцентним	—“—	100	100

барвником FITC, або Alexa Fluor 488, або еквівалент			
Моноклональне антитіло CD69, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент	—“—	67	67
Моноклональне антитіло CD79а, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	373	373
Моноклональне антитіло CD81, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	217	217
Моноклональне антитіло CD90, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	200	200
Моноклональне антитіло CD99, мічене флюоресцентним барвником ECD, або PE-Texas Red, або PE-CF594, або еквівалент	—“—	200	200
Моноклональне антитіло CD117, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	234	234
Моноклональне антитіло CD117, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент	—“—	200	200
Моноклональне антитіло CD117, мічене	—“—	200	200

флюоресцентним барвником PE-Cy7, або еквівалент			
Моноклональне антитіло CD123, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5.5, PerCP-Cy5.5, або еквівалент	тестів	300	300
Моноклональне антитіло CD127, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	0	0
Моноклональне антитіло CD157, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	67	67
Моноклональне антитіло Anti- MPO, мічене флюоресцентним барвником FITC, або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—“—	234	234
Моноклональне антитіло Anti- TdT, мічене флюоресцентним барвником FITC, або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—“—	250	250
Моноклональне антитіло CDNG2, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	200	200
Моноклональне антитіло HLA- DR, мічене флюоресцентним барвником FITC, або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—“—	367	367

Моноклональне антитіло HLA-DR, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	400	400
Моноклональне антитіло HLA-DR, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент	—“—	167	167
Моноклональне антитіло Ig M, мічене флюоресцентним барвником FITC, або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—“—	600	600
Моноклональне антитіло TCR α/β , мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	1700	1700
Моноклональне антитіло TCR γ/δ , мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	1700	1700
Моноклональне антитіло Anti-каппа/Anti-Lambda/CD19, мічене флюоресцентним барвником FITC/PE/ECD, або FITC/PE/PerCP, або еквівалент	—“—	875	875
Моноклональні антитіла CD3/CD16+CD56, мічені флюоресцентними барвниками FITC/PE, або еквівалент	тестів	1800	1800
Моноклональні антитіла CD45/CD4/CD3, мічені флюоресцентними барвниками FITC/RD1/PC5, або FITC/PE/PerCP, або еквівалент	—“—	1400	1400

Набір реагентів для визначення клітинного циклу (детекція змін вмісту ДНК в клітинах при переході через фази G0, G1, S, G2, M)	флаконів	4	4
Набір реагентів для визначення гемопоетичних клітин-попередників у біологічних зразках	—“—	15	15
Барвник нуклеїнових кислот SYTO 16	—“—	5	5
Барвник нуклеїнових кислот 7-AAD	—“—	14	14
Обжимна рідина для проточного цитофлюориметра	упаковок	91	91
Натрій фосфатний буфер (PBS), розчин	—“—	24	24
Розчин для фіксації та пермеабілізації клітин для внутрішньоклітинного дослідження	—“—	12	12
Розчин для лізису еритроцитів після фарбування клітин моноклональними антитілами по протоколу “без відмивання”	флаконів	26	26
Розчин для промивання системи проточного цитофлюориметра	упаковок	13	13
Розчин для лізису еритроцитів після фарбування клітин моноклональними антитілами, десятикратний концентрат	флаконів	26	26

Набір буферних розчинів для фіксації, пермеабілізації та відмивання клітин	наборів	11	11
Пробірки для проточного цитофлюориметра, 12 x 75 мм, блакитні	упаковок	38	38

Реагенти для молекулярно-генетичних досліджень методом ПЛР

Набір реагентів (10 сумішей мультиплексних маркерів) для HLA-типування та детекції химеризму	наборів	1	1
Набір реагентів (30 маркерів) для моніторингу химеризму методом кількісної ПЛР	—“—	1	1
Розчин октилфеноксиполіетанолу (NP-40)	флаконів	3	3
Набір хромосом-специфічних ДНК зондів CEP X/CEP Y (сателіт III), призначених для ідентифікації центромірних регіонів хромосом та виявлення анеуплоїдій в інтерфазі та метафазі	наборів	3	3
Флюоресцентний барвник DAPI у підтримуючому розчині Антифейд	флаконів	20	20
Набір хромосом-специфічних ДНК зондів CEP7 (Альфа Сателіт), призначених для ідентифікації центромірних регіонів хромосом та виявлення анеуплоїдій в інтерфазі та метафазі	наборів	4	4

Набір двоколірних проб, призначений для виявлення транслокації за участю гена BCR-ABL	—“—	4	4
Набір двоколірних проб, призначений для виявлення транслокацій гена PML хромосомної області 15q22 та гена RARa хромосомної області 17q12.1	—“—	3	3
Набір двоколірних проб, призначений для виявлення перебудов за участю гена CBFB	—“—	2	2
Набір двоколірних проб, призначений для виявлення транслокацій за участю генів RUNX1 та RUNX1T1	—“—	2	2
Набір ДНК-зондів 7 q до теломерних ділянок хромосом, призначених для виявлення делецій та перебудов на кінцевих ділянках плечей хромосом	—“—	1	1
Універсальний набір реагентів, призначений для проведення ПЛР у режимі реального часу для ампліфікації геномних послідовностей, плазмідних або кДНК, включаючи кількісне визначення та генотипізацію	—“—	13	13
Набір реагентів для проведення зворотної транскрипції кДНК	—“—	1	1
Середовище RPMI 1640	флакони	70	70
Фетальна бичача сироватка (FBS)	—“—	0	0

96-лункові плашки з цільнолитого поліпропілену, сумісні із системами ПЛР у реальному часі, рециркуляційними системами та термоциклерами	упаковок	9	9
Оптичні клейкі адгезивні плівки для мікроплашек	упаковок	2	2
Набір реагентів для генотипування генів системи KIR методом ПЛР з детекцією в агарозному гелі	наборів	1	1
Набір реагентів для мультиплексного якісного визначення мутації генів BCR/ABL1 методом ПЛР з детекцією в агарозному гелі	—“—	1	1
Набір реагентів для визначення мутації гена FLT3 методом ПЛР з детекцією в агарозному гелі	—“—	1	1
Набір реагентів для виявлення транслокацій транскрипційного фактора p53, розташованого на хромосомному сегменті 17p13.1	—“—	0	0
Набір реагентів для виявлення транслокацій транскрипційного фактора TCF3	—“—	0	0
Набір реагентів для виявлення транслокацій гена MECOM	—“—	0	0
Набір реагентів для виявлення та кількісної оцінки транскриптів mbcr p210 b2a2 або b3a2 генів BCR-ABL	—“—	0	0

методом ПЛР у реальному часі			
Набір реагентів для виявлення та кількісної оцінки транскриптів генів RUNX1-RUNX1T1 (або AML1-ETO) методом ПЛР у реальному часі	—“—	0	0
Набір реагентів для виявлення та кількісної оцінки транскриптів генів CBFB-MYH11 А методом ПЛР у реальному часі	—“—	0	0
Набір сиквес-специфічних праймерів з низькою роздільною здатністю для скринінгового визначення алелей HLA класів I та II (ABDR)	—“—	53	53
Набір сиквес-специфічних праймерів з низькою роздільною здатністю для скринінгового визначення алелей HLA класу I (C)	—“—	7	7
Набір сиквес-специфічних праймерів з низькою роздільною здатністю для скринінгового визначення алелей HLA класу II (DQB1)	наборів	4	4
Набір реагентів для виділення ДНК з цільної крові, культивованих клітин, сироватки, плазми або інших рідин організму кремнієво-мембранним методом за принципом хаотропного зв'язування солей	—“—	14	14

Термостабільна ДНК-полімераза	упаковок	57	57
Агароза	—“—	12	12
Буфер з бромідом етидію для типування за допомогою сиквес-специфічних праймерів	—“—	480	480
Набір реагентів з високою роздільною здатністю для генотипування HLA локусу A	наборів	2	2
Набір реагентів з високою роздільною здатністю для генотипування HLA локусу B	—“—	0	0
Набір реагентів з високою роздільною здатністю для генотипування HLA локусу C	—“—	0	0
Набір реагентів з високою роздільною здатністю для генотипування HLA локусу DRB1 по ексонам 2 та 3	—“—	1	1
Набір реагентів з високою роздільною здатністю для генотипування HLA локусу DQB1 по ексонам 2 та 3, 2 ампліфікації	—“—	1	1
4-капілярна матриця без внутрішнього покриття для сиквенування та аналізу фрагментів	упаковок	3	3
Полімер POP-7	флаконів	25	25
Концентрований робочий буфер з ЕДТА для електрофорезу	—“—	0	0

Реагент інгібітор рибонуклеаз	упаковок	23	23
Набір розчинів для деградації ДНК ПЛР	наборів	7	7
Набір реагентів для виявлення та кількісної оцінки химерного білка PML-RAR α bcr1 методом ПЛР у реальному часі	—“—	1	1
Набір стандартів химерного білка PML-RAR α bcr1	—“—	2	2
Набір реагентів для виявлення та кількісної оцінки химерного білка PML-RAR α bcr2 методом ПЛР у реальному часі	наборів	1	1
Набір стандартів химерного білка PML-RAR α bcr2	—“—	2	2
Набір реагентів для виявлення та кількісної оцінки химерного білка PML-RAR α bcr3 методом ПЛР у реальному часі	—“—	4	4
Набір стандартів химерного білка PML-RAR α bcr3	—“—	1	1
Набір реагентів кількісного виявлення мутацій генів ETV6/RUNX1 (TEL/AML) за допомогою ПЛР у реальному часі	—“—	5	5
Набір стандартів контрольних генів ETV6/RUNX1 (TEL/AML)	—“—	2	2
Набір реагентів для виявлення та кількісної оцінки транскриптів mbcr p190 e1a2 генів BCR-ABL методом ПЛР у	—“—	5	5

реальному часі			
Набір стандартів контрольних генів BCR-ABL на 3 розведення	—“—	3	3
Набір стандартів контрольних генів BCR-ABL на 4 розведення	—“—	2	2
Набір стандартів контрольних генів ABL	—“—	4	4
Набір стандартів контрольних генів TCF3-PBX1	—“—	2	2
Набір стандартів контрольних генів SIL-TAL	—“—	2	2
Набір стандартів контрольних генів AML1-ETO	—“—	1	1
Набір стандартів типу А контрольних генів CBFB-MYH11	—“—	2	2
Набір стандартів типу Д контрольних генів CBFB-MYH11	—“—	0	0
Набір стандартів типу Е контрольних генів CBFB-MYH11	—“—	0	0
Набір стандартів транскриптів e10e4 контрольних генів MLL-AF4	—“—	1	1
Набір стандартів транскриптів e9e5 контрольних генів MLL-AF4	—“—	1	1

Набір стандартів транскриптів e11e5 контрольних генів MLL-AF4	наборів	1	1
Набір стандартів транскриптів e8e10 контрольних генів MLL-AF9	—“—	1	1
Набір стандартів транскриптів e10e6 контрольних генів MLL-AF9 типу A	—“—	1	1
Набір стандартів транскриптів e8e9 контрольних генів MLL-AF9 типу B	—“—	1	1
Набір стандартів транскриптів e10e2 контрольних генів MLL-AF1p	—“—	1	1
Набір стандартів транскриптів e8e2 контрольних генів MLL-AF6	—“—	1	1
Набір стандартів транскриптів e2e8 контрольних генів MLL-DUP	—“—	1	1
Набір стандартів транскриптів e10e2 контрольних генів MLL-ENL	—“—	1	1
Набір стандартів транскриптів e9e2 контрольних генів MLL-ENL	—“—	1	1
Набір стандартів транскриптів e8e2 контрольних генів MLL-ELL	—“—	1	1
Набір стандартів транскриптів e9e2 контрольних генів MLL-ELL	—“—	1	1

Набір реагентів для кастомного синтезу з метою оцінки експресії генів методом ПЛР у реальному часі	—“—	40	40
Флюоресцентні олігопраймери фосфатної групи (5'-кінець)	упаковок	2	2
Флюоресцентний зонд з барвником тетраметилродамін	—“—	30	30
Набір реагентів для налаштувань реакцій ПЛР у реальному часі	наборів	6	6
Оптичні пробірки з кришками у стріпах по 8 штук, 0,2 мкл	упаковок	20	20
Мікрочип типу WT для мікрочипової системи електрофорезу нуклеїнових кислот MultiNA	штук	2	2
Пробірки для ПЛР без кришки, 0,2 мкл	упаковок	4	4
Набір реагентів для сепарації, визначення розміру та кількісного аналізу фрагментів дволанцюгової ДНК в інтервалі 100—1000 пар нуклеотидів	наборів	2	2
Набір стандартів для визначення довжини дволанцюгової ДНК в інтервалі 100—1500 пар нуклеотидів на агарозних або поліакриламідних гелях	—“—	1	1
Набір реагентів для сепарації, визначення розміру та кількісного аналізу фрагментів дволанцюгової ДНК в інтервалі	—“—	2	2

25—500 пар нуклеотидів			
Набір стандартів для визначення довжини дволанцюгової ДНК в інтервалі 25—700 пар нуклеотидів на агарозних або поліакриламідних гелях	—“—	1	1
Зафарбований гель з чутливістю до нуклеїнових кислот, що збуджується за допомогою ультрафіолету або видимого світла	флаконів	1	1
Буфер Тріс-ЕДТА, рН 8,0	—“—	1	1
Розчин для очищення мікрочипової системи електрофорезу нуклеїнових кислот	—“—	1	1
Пробірки тонкостінні з поліпропілену для використання з флюорометром Qubit	упаковок	4	4
Набір реагентів для селективного аналізу дволанцюгової ДНК над РНК, для використання з флюорометром Qubit	набір	8	8
Набір реагентів для кількісного визначення зразків РНК з низьким вмістом, для використання з флюорометром Qubit	—“—	10	10
Флюоресцентний зонд TaqMan	упаковок	10	10

Набір реагентів для швидкого очищення геномної ДНК з цільної крові, сироватки, плазми або інших рідин організму	наборів	0	0
Набір реагентів для виявлення одонуклеотидних поліморфізмів у геномі	—“—	2	2
Набір реагентів для проведення кількісного аналізу мікро-РНК	—“—	0	0
Набір реагентів для проведення зворотної транскрипції мікро-РНК	—“—	0	0
Набір реагентів для виділення РНК та ДНК з парафінізованих зразків силікатно-мембранним методом	наборів	5	5
Набір для виділення мікро-РНК та РНК з клітин і тканин силікатно-мембранним методом	—“—	0	0
Набір реагентів для виділення РНК із свіжої або замороженої цільної крові із систем для забору крові (з EDTA, цитратом, гепарином) кремнієво-мембранним методом	—“—	3	3
Набір для виділення ДНК з тканин силікатно-мембранним методом	—“—	5	5
Набір реагентів для виділення РНК силікатно-мембранним методом на основі мініспін	—“—	3	3

КОЛОНОК			
Реагент РНКаза	упаковок	1	1
Реагент Протеїназа К	—“—	1	1
Розчин для стабілізації та захисту клітинної РНК в інтактних, незаморожених зразках тканин	флаконів	2	2
Розчин Версена	—“—	20	20
Набір реагентів для проведення ПЛР у реальному часі з використанням барвника SYBR Green	наборів	3	3
Ферменти для рестрикції ДНК	упаковок	2	2
Реагент РНК інгібітор	—“—	1	1
Розчин для депарафінізації	флаконів	1	1
Набір реагентів для одночасного виділення геномного ДНК і загальної РНК з парафінових блоків	наборів	3	3
Набір реагентів для одночасного виділення геномного ДНК і загальної РНК	—“—	1	1
Набір реагентів для швидкого виділення геномної ДНК із зразків тканин	—“—	1	1
Наконечники пластикові 200 μ l для автоматичної станції	упаковок	1	1

QIAcube			
Наконечники пластикові 1000 μ l для автоматичної станції QIAcube	—“—	11	11
Штатив для пляшок 6 x 30 мл для автоматичної станції QIAcube	упаковок	1	1
Пляшки для реагентів 6 x 30 мл для автоматичної станції QIAcube	—“—	1	1
Набір одноразових роторних адаптерів та елюційних пробірок (1,5 мл) для автоматичної станції QIAcube	—“—	1	1

Реагенти та витратні матеріали для проведення імуноцитологічних та молекулярно-генетичних досліджень методом флюоресцентної гібридизації in situ (FISH)

Набір двоколірних ДНК-зондів 1p36/1q25 та 19q13 /19p13	наборів	3	3
Набір двоколірних проб, призначений для виявлення точки розриву в хромосомній області 11q23, що містить ген MLL	—“—	6	6
Набір ДНК-зондів, призначений для виявлення кількості копій мішені зонда TP53, розташованого в хромосомі 17p13.1, і мішені зонда CEP 17, розташованої в центромері хромосоми 17	—“—	2	2
Набір двоколірних проб, призначений для виявлення	—“—	2	2

точки розриву в хромосомній області 13q14.11, що містить ген FOXO1			
Набір двоколірних проб, призначений для виявлення точки розриву в хромосомній області 12q13, що містить ген DDIT3	—“—	1	1
Набір двоколірних проб, призначений для виявлення точки розриву в хромосомній області 18q11.2, що містить ген SS18	—“—	1	1
Набір двоколірних проб, призначений для виявлення точки розриву в хромосомній області 16p11, що містить ген FUS	—“—	1	1
Набір двоколірних проб, призначений для виявлення кількості копій онкогена N-MYC в області 2p24 хромосоми 2	—“—	3	3
Набір двоколірних проб, призначений для виявлення транслокацій за участю генів TEL (ETV6) та AML (RUNX1)	—“—	4	4
Набір двоколірних проб, призначений для виявлення точки розриву гена EWSR1 в хромосомній області 22q12	наборів	2	2
Суміш хлориду та цитрату соди	упаковок	1	1
Набір триколірних проб, призначений для виявлення зворотної транслокації t (8; 14)	наборів	2	2

(q24; q32) за участю областей генів IGH та MYC			
Набір ДНК зондів, призначений для виявлення ампліфікації гена HER-2 / neu у зразках тканини, фіксованих формаліном, заключених у парафін	—“—	1	1
Набір ДНК зондів, призначений для виявлення транслокацій за участю гена ALK в зразках тканин легень	—“—	1	1
Формаїд	літрів	5	5
Набір ДНК зондів, призначений для виявлення транслокацій за участю гена C-MYC в хромосомній області 8q24.2	наборів	1	1
Набір хромосом-специфічних ДНК зондів CEP 9, призначених для ідентифікації центромірних регіонів хромосом та виявлення анеупloidій в інтерфазі та метафазі	—“—	0	0
Буфер для гібридизації WCP (зонди повного фарбування хромосом або їх крупних частин)	упаковок	0	0
Набір двоколірних проб, призначений для виявлення транслокації за участю генів DEK та NUP214 людини, розташованих на хромосомних сегментах 6p22.3 та 9q34.13 відповідно	наборів	2	2

Набір двоколірних проб, призначений для виявлення транслокації за участю локусу IGH людини та гена FGFR3, розташованих на хромосомних сегментах 14q32.33 та 4p16.3 відповідно	—“—	2	2
Набір двоколірних проб, призначений для виявлення делецій в області гена CSF1R людини, розташованого на хромосомному сегменті 5q32 і області навколо STS маркерів D5S23 і D5S721	—“—	2	2
Набір двоколірних проб, призначений для виявлення кількості копій маркера D13S319 на хромосомному сегменті 13q14, та кількості копій маркера 13q34 на хромосомному сегменті 13q34	наборів	2	2
Набір реагентів для виявлення делецій локус-специфічного маркера D20S108, розташованого на хромосомному сегменті 20q12	—“—	2	2
Набір двоколірних проб, призначений для виявлення транслокації за участю локусів TCF3 та PBX1 людини, розташованих на хромосомних сегментах 19p13.3 та 1q23 відповідно	—“—	0	0
Набір двоколірних проб, призначений для виявлення транслокації за участю генів IGH та BCL2 людини, розташованих на хромосомних сегментах 14q32.33 та 18q21.33	—“—	2	2

відповідно			
Набір багатоколірних проб для виявлення теломерних ділянок всіх хромосом	—“—	1	1
Культуральне середовище для використання у короткотривалому культивуванні клітин кісткового мозку та інших гемопоетичних клітин	упаковок	19	19
Буферні таблетки для фарбування G-сегментів хромосом розчином барвника Гімза, рН 6.8	—“—	1	1
Розчин N-десацетил-N-метилоколіцину в збалансованому сольовому розчині Хенкса	флаконів	6	6
Розчин трипсину 0,25% з фенолом червоним без ЕДТА	—“—	10	10
Розчин барвника Гімза для фарбування G-сегментів хромосом	—“—	4	4
Розчин рибонуклеази А	упаковок	2	2
Культуральне середовище для каріотипування: базальне середовище RPMI-1640, доповнене L-глутаміном, гентаміцином сульфатом, ФБС та фітогемагглютиніном	—“—	178	178
Розчин фітогемагглютиніну, Мформа	—“—	2	2

Добавка інсулін-трансферрин-селен до культурального середовища	флаконів	8	8
Розчин пепсину А в азиді натрію	—“—	1	1
Розчин L-глутаміну	—“—	7	7
Антибіотик-антимікотик (пеніцилін 10000 U/мл, стрептоміцин 10000 мг/мл, амфотеріцин В 25 мкг/мл) 100х концентрат	—“—	7	7
Розчин фіколлу, щільність 1,077 г/мл	—“—	2	2
Хлорид калію	упаковок	2	2

*Реагенти та витратні матеріали для забезпечення
процесу секвенування під час діагностики онкогематологічних
захворювань та моніторингу лікування*

Набір для очищення ДНК після ПЛР та гель-електрофорезу	наборів	2	2
Набір реактивів для проведення секвенування на основі флюоресценції одноланцюгових або дволанцюгових зразків ДНК, фрагментах ПЛР	—“—	2	2
Набір розчинів для очищення секвенсової суміші (розчин для видалення неінкорпорованих термінаторів барвників та вільних солей із реакції після секвенування та розчин для стабілізації реакції після	—“—	1	1

очищення)			
Високоочищений деіонізований формамід	флаконів	4	4
Гумові покриття для 96-лункових плашок	упаковок	4	4
Стандарт з високою щільністю, який марковано п'ятьма барвниками, для відтворюваного визначення розмірів даних аналізу фрагментів	наборів	1	1
Тріс-ацетат-ЕДТА буфер, 10х концентрат	флаконів	10	10
Набір реактивів для проведення секвенування з метою виявлення соматичних варіантів мієлоїдних злоякісних новоутворень (гострий мієлолейкоз, мієлодиспластичний синдром, мієлопроліферативні новоутворення, хронічний мієлолейкоз, хронічний мієломоноцитарний лейкоз, ювенільний мієломоноцитарний лейкоз)	наборів	2	2
Набір реагентів для підготовки бібліотек зразків з ДНК, вилученої з периферичної цільної крові та тканини, фіксованої формаліном, заключеної у парафін	наборів	2	2
Набір реагентів для проведення циклів секвенування за допомогою системи MiSeq	—“—	12	12

Набір реагентів для типування генів лейкоцитарного антигена людини за 11 локусами	—“—	2	2
Набір реагентів для проведення лонг-рендж полімеразної ланцюгової реакції	—“—	1	1
Набір реагентів для проведення нанопотокового секвенування за допомогою системи MiSeq	—“—	6	6
Готова до використання бібліотека управління послідовних прогонів	—“—	1	1
Набір реагентів для кількісної оцінки сукупності фрагментів зразка ДНК/РНК однакової довжини	—“—	1	1
Набір реагентів для очищення та вибору розміру фрагментів ДНК у процесі побудови бібліотеки секвенсу наступного покоління	—“—	1	1
Набір реагентів для визначення бібліотеки ампліконів	—“—	4	4
Набір реагентів для визначення генетичних індексів	—“—	1	1
Набір реагентів для визначення точок мутацій 50 генів, які асоційовані з раком	—“—	1	1
Набір реагентів для проведення секвенування за допомогою системи MiSeq	—“—	1	1

Набір реагентів для ампліфікації 15 генів із зразків парафінізованих солідних пухлин фіксованих у формаліні	—“—	2	2
---	-----	---	---

Реагенти та медичні вироби для імуногістохімічної і морфологічної діагностики та диференційної діагностики солідних пухлин

Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення цитокератину	упаковок	2	2
Поліклональні антитіла кроля з реактивністю проти людини для визначення альфа-1-фетопротейну	—“—	4	4
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення CD246	упаковок	3	3
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення білка Bcl2	—“—	1	1
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення білка Bcl6	—“—	2	2
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення CA125	—“—	3	3
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення кальретиніну	—“—	3	3
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення CD1a	—“—	2	2
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини	—“—	3	3

для визначення CD10			
Поліклональні антитіла кроля з реактивністю проти людини для визначення CD117	—“—	3	3
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення CD138	—“—	3	3
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення CD15	—“—	2	2
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення CD20cy	—“—	4	4
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення CD23	—“—	3	3
Поліклональні антитіла кроля з реактивністю проти людини для визначення CD3	—“—	3	3
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення CD30	—“—	3	3
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення CD31	—“—	2	2
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення CD34	—“—	3	3
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення CD38	—“—	3	3

Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення CD4	—“—	3	3
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення CD45	—“—	3	3
Моноклональні антитіла кроля з реактивністю проти людини для визначення CD5	упаковок	3	3
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення CD56	—“—	2	2
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення CD68	—“—	2	2
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення CD8	—“—	4	4
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення CD99	—“—	3	3
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення білка CDX2	—“—	2	2
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення раково-ембріонального антигена	—“—	2	2
Поліклональні антитіла кроля з реактивністю проти людини для визначення хромограніну А	—“—	2	2

Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення цитокератину 20	—“—	3	3
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення цитокератину 7	—“—	3	3
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення колагену IV типу	—“—	3	3
Моноклональні антитіла кроля з реактивністю проти людини для визначення цикліну D1	—“—	3	3
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення десміну	—“—	3	3
Моноклональні антитіла миші для визначення вірусу Епштейн-Барра	—“—	3	3
Поліклональні антитіла кроля для визначення гліального фібрилярного кислого білка	—“—	2	2
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення гепатоцитів	—“—	3	3
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення меланоми	—“—	2	2
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення інгібіну альфа	упаковок	4	4

Поліклональні антитіла кроля з реактивністю проти людини для визначення легких ланцюгів каппа	—“—	2	2
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення Ki-67	—“—	6	6
Поліклональні антитіла кроля з реактивністю проти людини для визначення легких ланцюгів Лямбда	—“—	3	3
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення м'язового актину	—“—	3	3
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення мелану А	—“—	2	2
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення білка MUM1	—“—	2	2
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення білка MyoD1	—“—	2	2
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення міогеніну	—“—	4	4
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення нейрон-специфічної енолази	—“—	3	3
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення білка p53	—“—	3	3

Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення В-клітинспецифічного білка-активатора	—“—	2	2
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення плацентарної алкалінової фосфатази	—“—	3	3
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення рецептора прогестерону	—“—	1	1
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення маркерів карциноми ниркових клітин	—“—	2	2
Поліклональні антитіла кроля для визначення білка S100	—“—	2	2
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення актину гладенької мускулатури	упаковок	3	3
Моноклональні антитіла миші для визначення синаптофізину	—“—	2	2
Поліклональні антитіла кроля з реактивністю проти людини для визначення тиреоглобуліну	—“—	2	2
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення фактору транскрипції щитоподібної залози	—“—	2	2
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини	—“—	2	2

для визначення рецептора 1 судинного ендотеліального фактору росту			
Моноклональні антитіла миші для визначення віментину	—“—	3	3
Поліклональні антитіла кроля з реактивністю проти людини для визначення фактору Віллебранда	—“—	2	2
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення пухлинного білка Вільмса	—“—	2	2
Система візуалізації для імуногістохімії, високий рН	—“—	6	6
Олівець імуногістохімічний гідрофобний	штук	24	24
Ножі для мікротомів	упаковок	90	90
Бальзам гістологічний синтетичний	—“—	16	16

Медикаменти для дітей, хворих на первинні (вроджені) імунодефіцити

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Орієнтовний обсяг потреби, 100 відсотків	Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення	флакони	50 мл, 5 % (50 мг/мл)	2747	2311

Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення	—“—	100 мл, 5 % (50 мг/мл)	1601	1347
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення	—“—	50 мл, 10 % (100 мг/мл)	1495	1255
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення	—“—	100 мл, 10 % (100 мг/мл)	513	429
Імуноглобулін людини нормальний для підшкірного введення	—“—	10 мл, 16—20 % (160—200 мг/мл)	1718	1442
Імуноглобулін людини нормальний для підшкірного введення	—“—	20 мл, 16—20 % (160—200 мг/мл)	831	698
Ітраконазол	капсули	100 мг	3285	2759
Ітраконазол	флакони	150 мл № 1 з дозатором, розчин оральний, 10 мг/мл	1653	1389
Вориконазол	таблетки	50 мг	730	612
Вориконазол	—“—	200 мг	0	0
Вориконазол	флакони, порошок	200 мг	110	93

	для розчину для інфузій			
Амфотерицин В	флакони, ліофілізат для розчину для інфузій	50 мг	0	0
Посаконазол	суспензія оральна	40 мг/мл, по 105 мл у флаконі	18	16
Колістиметат натрію	порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій	1 млн. МО	0	0
Тейкопланін	флакони, ліофілізат для розчину для ін'єкцій	200 мг	0	0
Тейкопланін	—“—	400 мг	0	0
Філграстим	розчин для ін'єкцій	300 мкг/мл (30 млн. МО) по 1 мл у флаконі	299	251
Анакінра	попередньо наповнені шприци	100 мг/0,67 мл	2970	2496
Канакінумаб	ампули, флакони, шприци	150 мг	18	15
Сиролімус	таблетки	1 мг	2555	2151
Інгібітор С1-естерази людини	флакони, ліофілізат для приготування розчину для внутрішньовенного	1 МО	64950	54545

	введення			
--	----------	--	--	--

**Медикаменти для дорослих, хворих на первинні (вроджені)
імунодефіцити**

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Орієнтовний обсяг потреби, 100 відсотків	Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення	флакони	50 мл, 5 % (50 мг/мл)	4	4
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення	—“—	100 мл, 5 % (50 мг/мл)	697	585
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення	—“—	50 мл, 10 % (100 мг/мл)	3288	2758
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення	—“—	100 мл, 10 % (100 мг/мл)	894	751
Імуноглобулін людини нормальний для підшкірного введення	—“—	10 мл, 15— 20 % (150—200 мг/мл)	580	488
Імуноглобулін людини	—“—	20 мл, 15— 20 %	2738	2296

нормальний для підшкірного введення		(150—200 мг/мл)		
Інгібітор С1-естерази людини	флакони, ліофілізат для приготування розчину для внутрішньовенного введення	1 МО	1137563	954585
Анакінра	попередньо наповнені шприци	100 мг/0,67 мл	1095	918

**Медикаменти для дітей, хворих на нанізм
різного походження**

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Орієнтовний обсяг потреби, 100 відсотків	Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування	Примітка
Соматропін	флакон, флакон з адаптером для безголкового інжектора, картридж, шприц-ручка	мг	559000	469070	для дітей віком після 10 років
Соматропін	картридж, шприц-ручка, флакон з адаптером для безголкового інжектора	мг	84003	70493	для дітей віком до 10 років

Витратні матеріали для лікування хворих методом перитонеального діалізу

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Орієнтовний обсяг потреби,	Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу
------------------------	----------------	----------------------------	---

		100 відсотків	фінансуванн я
Тримач органайзера до системи стей-сейф, або еквівалент	штук	5	5
Органайзер до системи стей- сейф, або еквівалент	—“—	5	5
Дезінфекційний ковпачок до системи стей-сейф, або еквівалент	—“—	71644	60116
Адаптер до катетера Луер-Лок	—“—	22	20
Катетер Тенкхофф 835, або еквівалент	—“—	169	144
Подовжувач катетера, 32 см, до системи стей-сейф, або еквівалент	штук	52	45
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 1,35—1,5 % у мішках подвійних по 2000 мл, система стей-сейф, або еквівалент	—“—	38587	32378
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 1,35—1,5 % у мішках подвійних по 2500 мл, система стей-сейф, або еквівалент	—“—	0	0
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 3,85—4,25 % у мішках подвійних по 2000 мл, система стей-сейф, або еквівалент	—“—	5976	5013

Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 3,85—4,25 % у мішках подвійних по 2500 мл, система стей-сейф, або еквівалент	—“—	0	0
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 2,25—2,5 % у мішках подвійних по 2000 мл, система стей-сейф, або еквівалент	—“—	19605	16449
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 2,25—2,5 % у мішках подвійних по 2500 мл, система стей-сейф, або еквівалент	—“—	1460	1225
Адаптер до катетера для перитонеального діалізу	—“—	171	149
Трубка перехідна (подовжувач катетера) Луер-Лок	—“—	727	613
Затискач (перемикач) магістралей	—“—	381	323
Ковпачок дезінфікуючий (від'єднувальний)	—“—	754939	633499
Дренажний комплект до апарата для автоматизованого перитонеального діалізу	—“—	66874	56111
Касета до апарата для автоматизованого перитонеального діалізу	—“—	66121	55480
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 1,35—1,5 % у мішках	—“—	273408	229419

подвійних по 2000 мл (Y-система для перитонеального діалізу)			
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 2,25—2,5 % у мішках подвійних по 2000 мл (Y-система для перитонеального діалізу)	—“—	242498	203481
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 3,85—4,25 % у мішках подвійних по 2000 мл (Y-система для перитонеального діалізу)	штук	27119	22753
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 1,35—1,5 % у мішках подвійних по 2500 мл (Y-система для перитонеального діалізу)	—“—	5246	4401
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 2,25—2,5 % у мішках подвійних по 2500 мл (Y-система для перитонеального діалізу)	—“—	4527	3798
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 3,85—4,25 % у мішках подвійних по 2500 мл (Y-система для перитонеального діалізу)	—“—	1152	966
Розчин для перитонеального діалізу тривалої дії (без вмісту глюкози) у мішках подвійних по 2000 мл (Y-система для	—“—	63018	52878

перитонеального діалізу)			
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом амінокислот у мішках подвійних по 2000 мл (Y-система для перитонеального діалізу)	—“—	28029	23517
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 1,35—1,5 % у пластиковому мішку по 5000 мл, одинарному, обладнаному ін'єкційним портом та з'єднувачем	—“—	45185	37911
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 2,25—2,5 % у пластиковому мішку по 5000 мл, одинарному, обладнаному ін'єкційним портом та з'єднувачем	—“—	76405	64110
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 3,85—4,25 % у пластиковому мішку по 5000 мл, одинарному, обладнаному ін'єкційним портом та з'єднувачем	—“—	8643	7251
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози у пластиковому мішку по 2000 мл, одинарному, обладнаному ін'єкційним портом та з'єднувачем	—“—	0	0
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози у пластиковому мішку по 2500 мл, одинарному, обладнаному ін'єкційним портом та з'єднувачем	штук	0	0

Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози у пластиковому мішку по 3000 мл, одинарному, обладнаному ін'єкційним портом та з'єднувачем	—“—	0	0
--	-----	---	---

Медикаменти та медичні вироби для дитячого діалізу

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Орієнтовний обсяг потреби, 100 відсотків	Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування
Комплект складових для гемодіалізу у дітей (діалізатор 1,0—1,1 м ² , AV-магістралі, фістульні голки G17-19 (голки 2 штуки: 1 венозна голка, 1 артеріальна голка), бікарбонатний картридж типу ViBag), або еквівалент	комплектів	4312	3616
Комплект складових для гемодіалізу у дітей (діалізатор 1,2—1,4 м ² , AV-магістралі, фістульні голки G17-19 (голки 2 штуки: 1 венозна голка, 1 артеріальна голка), бікарбонатний картридж типу ViCart), або еквівалент	—“—	1731	1452
Комплект складових для гемодіалізу у дітей (діалізатор 1,2—1,4 м ² , AV-магістралі, фістульні голки G17-19 (голки 2 штуки: 1 венозна голка, 1 артеріальна	—“—	790	662

голка), бікарбонатний картридж типу ViBag), або еквівалент			
Набір для постійного вено-венозного гемодіалізу педіатричний CRRT/SCUF (multiFiltrate Kit paed CRRT/SCUF), або еквівалент, фільтраційний пакет на 10 л (Filtrate bag 10 L), або еквівалент	—“—	20	16
Набір для мембранного розділення плазми MPSP1 (multiFiltrate Kit MP SP1 dry), або еквівалент, фільтраційний пакет на 10 л (Filtrate bag 10 L), або еквівалент	—“—	105	88
Набір для довготривалої гемодіафільтрації (multiFiltrate Kit Midi CVVHDF 400), або еквівалент, фільтраційний пакет на 10 л (Filtrate bag 10 L), або еквівалент	комплектів	98	82
Розчин для гемодіалізу та гемофільтрації з концентрацією 2 ммоль/л калію, мішок по 5 літрів	—“—	424	355
Комплект складових для гемодіалізу з функцією гемодіафільтрації у дітей (діалізатор 0,6—0,7 м ² , AV-магістралі, фістульні голки G17-19 (голки 2 штуки: 1 венозна голка, 1 артеріальна голка), бікарбонатний картридж типу ViBag), або еквівалент	—“—	105	88

Фільтр “Діасейф Плюс”, або еквівалент (1 фільтр на 50 комплектів для гемодіалізу з функцією гемодіафільтрації у дітей)	штук	117	98
Комплект витратних матеріалів до апарата для гемодіалізу 4008H з модулем екстракорпоральної підтримки печінки Prometheus	комплектів	10	8
Кислотний компонент для діалізу типу Д204 або його аналоги, у каністрах ємністю не менше 10 л (розведення до 1/34)	штук	0	0
Кислотний компонент для діалізу типу Д204 або його аналоги, у каністрах ємністю не менше 7,8 л (розведення до 1/44)	—“—	902	755
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 2,25—2,5 % у мішках подвійних по 2000 мл	—“—	12765	10709
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 3,85—4,25 % у мішках подвійних по 2000 мл	—“—	6	5
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 1,35—1,5 % у мішках подвійних по 2000 мл	—“—	36539	30657
Ковпачок дезінфікуючий (від’єднувальний)	—“—	51604	43298
Розчини для перитонеального діалізу з концентрацією	—“—	2871	2407

глюкози 1,35—1,5 % для апаратного перитонеального діалізу, мішки по 5 л			
Розчини для перитонеального діалізу з концентрацією глюкози 2,25—2,5 % для апаратного перитонеального діалізу, мішки по 5 л	штук	1448	1214
Розчини для перитонеального діалізу з концентрацією глюкози 3,85—4,25 % для апаратного перитонеального діалізу, мішки по 5 л	—“—	246	206
Трубка перехідна (подовжувач катетера)	—“—	177	148
Затискач (перемикач) магістралей	—“—	145	123
Тримач органайзера до системи стей-сейф, або еквівалент	—“—	0	0
Органайзер до системи стей-сейф, або еквівалент	—“—	0	0
Педіатричний набір: комплект складових для апаратного перитонеального діалізу (касета до апарата), дренажний комплект	комплектів	2112	1770
Набір: комплект складових для апаратного перитонеального діалізу (касета до апарата), дренажний комплект	—“—	726	609
Катетер гемодіалізний двохпросвітний	штук	62	52

(двохканальний) у наборі розміром 6—6,5 Fr			
Катетер гемодіалізний двохпросвітний (двохканальний) у наборі розміром 7—8 Fr	—“—	52	43
Катетер гемодіалізний двохпросвітний (двохканальний) у наборі розміром 11—12 Fr	—“—	71	58
Апарат для автоматизованого перитонеального діалізу	—“—	2	2
Возик для апарата для автоматизованого перитонеального діалізу	—“—	3	2
Катетер для гострого перитонеального діалізу педіатричний Tenckhoff-Catheter прямої конфігурації розміром 250—300 мм у комплекті з адаптером	—“—	37	31
Катетер для гострого перитонеального діалізу педіатричний Tenckhoff-Catheter прямої конфігурації розміром 300—450 мм у комплекті з адаптером	—“—	2	2
Катетер для хронічного перитонеального діалізу педіатричний розміром 250—300 мм та конфігурації Curl Tenckhoff-Catheter у комплекті з адаптером	штук	8	6
Катетер для хронічного перитонеального діалізу педіатричний розміром 300—	—“—	14	11

450 мм та конфігурації Curl Tenckhoff-Catheter у комплекті з адаптером			
Катетер для хронічного перитонеального діалізу педіатричний розміром 450—570 мм та конфігурації Curl Tenckhoff-Catheter у комплекті з адаптером	—“—	14	11
Комплект складових для гемодіалізу у дітей (діалізатор 0,6—0,8 м ² , AV-магістралі, фістульні голки G17-19 (голки 2 штуки: 1 венозна голка, 1 артеріальна голка), бікарбонатний картридж типу BiCart), або еквівалент	комплектів	180	151
Набір для постійного вено-венозного гемодіалізу педіатричний CRRT/SCUF (Prismaflexset CRRT/SCUF), або еквівалент, фільтраційний пакет на 5 л (Filtratebag 5 л), або еквівалент, для дітей вагою від 11 кг	—“—	30	25
Набір для постійного вено-венозного гемодіалізу педіатричний CRRT/SCUF (Prismaflexset CRRT/SCUF), або еквівалент, фільтраційний пакет на 5 л (Filtratebag 5 л), або еквівалент, для дітей вагою від 8 кг	—“—	40	33
Розчин для гемодіалізу та гемофільтрації з концентрацією 4 ммоль/л калію, мішок по 5 л	штук	160	134

Ендопротези та набори для імплантації

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Орієнтовний обсяг потреби, 100 відсотків	Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування	Примітка
Кульшові суглоби цементні: тотальні ендопротези	штук	1627	1355	для використання у громадян з переломом шийки стегна чи за наявності коксартрозу різного генезу
Кульшові суглоби цементні: ендопротези однополюсні з подвійною сферою обертання	штук	500	416	для використання у громадян з переломом шийки стегна чи за наявності коксартрозу різного генезу
Тотальні ендопротези кульшового суглоба безцементні	—“—	4856	4061	—“—
Ендопротез кульшового суглоба ревізійний гібридної фіксації	—“—	134	110	для використання у громадян, що потребують ревізійного ендопротезування
Ендопротез колінного суглоба ревізійний	—“—	152	127	—“—

зв'язаний ротаційний				
Інтрамедулярний телескопічний ротаційно- стабільний фіксатор стегна з телескопічним фіксатором шийки стегнової кістки	—“—	21	17	для використання у громадян з недосконалим остеогенезом
Інтрамедулярний телескопічний ротаційно- стабільний фіксатор	—“—	43	38	—“—
Блокувальні елементи для інтрамедулярних фіксаторів	—“—	128	103	—“—
Модульний протез для дистального відділу стегнової кістки	—“—	37	31	для використання у дітей, хворих на пухлини кісток
Модульний протез для проксимального відділу великогомілко- вої кістки	—“—	26	23	—“—
Імпланти та інструменти	компле	3	3	для використання у дітей із

для корекції складних сколіотичних деформацій хребта	ктів			складними сколіотичним и деформаціям и хребта
--	------	--	--	---

Витратні матеріали для визначення рівня глюкози в крові, глікованого гемоглобіну

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Орієнтовний обсяг потреби, 100 відсотків	Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування
Тест-смужки для визначення глюкози для індивідуального глюкометра	штук	15881588	15881588

Лікарські засоби для дітей, хворих на розлади психіки та поведінки із спектра аутизму, з шизофренією, афективними розладами, гіперкінетичними розладами

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Орієнтовний обсяг потреби, 100 відсотків	Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування
Рисперидон	розчин оральний	1 мг/мл по 30 мл	610032	511417
Рисперидон	таблетки	1 мг	123401	103452
Рисперидон	—“—	2 мг	63769	53458
Арипіпразол	—“—	5 мг	122151	102406
Арипіпразол	—“—	10 мг	31319	26258

Арипіпразол	—“—	15 мг	18378	15407
Оланзапін	—“—	5 мг	32758	27461
Метилфенідат	таблетки, капсули з негайним вивільненням	10 мг	9154	7674
Метилфенідат	—“—	20 мг	2245	1883
Метилфенідат	таблетки, капсули з повільним вивільненням	20 мг	5475	4590
Метилфенідат	—“—	30 мг	3341	2801
Метилфенідат	—“—	36 мг	0	0
Метилфенідат	—“—	40 мг	695	583
Метилфенідат	—“—	54 мг	0	0
Атомоксетин	капсули	10 мг	108474	90938
Атомоксетин	—“—	18 мг	83588	70076
Атомоксетин	—“—	25 мг	121260	101657
Атомоксетин	—“—	40 мг	25366	21264
Атомоксетин	—“—	60 мг	11062	9275
Атомоксетин	—“—	80 мг	0	0
Флуоксетин	таблетки, капсули	20 мг	30846	25859
Солі вальпроєвої кислоти	сироп	1 мг	7489959	6279221
Солі вальпроєвої кислоти	таблетки	300 мг	349298	292829
Солі вальпроєвої кислоти	таблетки, капсули з повільним	300 мг	6798647	5699657

	вивільненням			
Солі вальпроєвої кислоти	таблетки	500 мг	212780	178383
Солі вальпроєвої кислоти	таблетки, капсули з повільним вивільненням	500 мг	1832920	1536631
Леветирацетам	розчин оральний	100 мг/1 мл	665597	597999
Леветирацетам	таблетки	250 мг	196651	164862
Леветирацетам	—“—	500 мг	14843	12443
Ламотриджин	таблетки, що диспергуються	50 мг	357197	299457
Ламотриджин	—“—	100 мг	4442	3724

**Директор департаменту
з фінансово-економічних питань,
бухгалтерського обліку
та звітності**

Л. Верета