

ЗМІНИ
до Критеріїв, за якими визначаються випадки інфекційних та
паразитарних захворювань, які підлягають реєстрації

1. Пункт 10 розділу II викласти в такій редакції:

«Дифтерія (*Corynebacterium diphtheriae*, *Corynebacterium ulcerans* та *Corynebacterium pseudotuberculosis*)

Клінічні критерії

Будь-яка людина із захворюванням верхніх дихальних шляхів з ларингітом, або назофарингітом, або тонзилітом та наявністю плівчастих нашарувань, що щільно прилягають та при зніманні яких спостерігається кровотеча, або псевдоплівчастим нашаруванням, які являють собою сіру масу з мертвих клітин, фібрину та мікроорганізмів.

Будь-яка людина з ознаками дифтерії іншої локалізації.

Лабораторні критерії

Ізоляція токсигенних штамів *Corynebacterium diphtheriae*, *Corynebacterium ulcerans* та *Corynebacterium pseudotuberculosis* з клінічного матеріалу та підтвердження виділення ними токсину за допомогою теста Елека. Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) може бути додатковим видом лабораторних досліджень, який підтверджує виділення збудником токс-гену.

Епідеміологічні критерії

Епідеміологічним зв'язком вважається один з таких випадків:
контакт з лабораторно підтвердженим випадком дифтерії;
передача від тварини до людини.

А. Підозрілий випадок	Будь-яка людина з клінічними критеріями дифтерії.
Б. Лабораторно підтверджений випадок	Будь-яка особа з лабораторними та клінічними критеріями. Особа, що мала контакт з лабораторно підтвердженим випадком, у якої відсутні клінічні симптоми, проте результат лабораторного дослідження позитивний на <i>Corynebacterium diphtheriae</i> та наявні докази виділення токсину, підтверджені тестом Елека. Особа з клінічними критеріями, від якої відібрано матеріал для бактеріологічного та ПЛР-дослідження, і при дослідженні бактеріологічним методом не визначено росту колоній <i>Corynebacterium diphtheriae</i>, <i>Corynebacterium ulcerans</i> та <i>Corynebacterium pseudotuberculosis</i>., а при дослідженні методом ПЛР отримано позитивний результат (виявлено токс-ген).
В. Епідеміологічно пов'язаний випадок	Будь-яка людина з клінічними критеріями дифтерії з епідеміологічним зв'язком з лабораторно підтвердженим випадком. Для респіраторної форми дифтерії враховується контакт в термін до 14 днів перед виникненням клінічних критеріїв. Дана класифікація застосовується при неможливості проведення лабораторних досліджень.
Г. Клінічно сумісний випадок	Підозрілий випадок, щодо якого було проведено епідеміологічне розслідування, в ході якого не було встановлено епідеміологічного зв'язку з лабораторно підтвердженим випадком та щодо якого не проводилось лабораторне дослідження.
Д. Відхилений випадок	Підозрілий випадок, щодо якого було проведено епідеміологічне розслідування і який відповідає принаймні одному з нижченаведених критеріїв: виділено штами <i>Corynebacterium diphtheriae</i>, <i>Corynebacterium ulcerans</i> та <i>Corynebacterium pseudotuberculosis</i> але отримано негативний результат при постановці тесту Елека (штам, що не виділяє токсин) АБО отримано негативний результат ПЛР на наявність гену токигенності (відсутність токс-гену).

».

**Генеральний директор
Директорату громадського здоров'я
та профілактики захворюваності**

І. РУДЕНКО