

**Критерії
віднесення певної категорії осіб до ключових груп та групи підвищеного
ризик у захворювання на туберкульоз**

1. До ключових груп захворювання на туберкульоз (далі- ключові групи) належать особи, які з урахуванням їх поведінкових практик, мають підвищений ризик інфікування мікобактеріями туберкульозу. Критеріями віднесення осіб до ключових груп є:

- 1) зловживання алкоголем;
- 2) вживання наркотичних засобів та психоактивних речовин;
- 3) вживання тютюнових виробів.

2. До груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз (далі – групи підвищеного ризику) належать особи, серед яких захворюваність на туберкульоз значно більша. Критерії віднесення до груп підвищеного ризику пов'язані з умовами життя та праці, станом здоров'я та фізіологічними станами.

3. Критеріями віднесення особи до групи підвищеного ризику, пов'язаними з умовами життя є:

- 1) наявність близького або осередкового контакту з людиною, яка хворіє на туберкульоз;
- 2) перебування в слідчих ізоляторах, установах виконання покарань, інших місцях перебування засуджених осіб та осіб, взятих під варту, та звільнення з місць позбавлення волі;
- 3) міграція або внутрішнє переміщення в межах країни;

4) перебування за межею бідності;

5) відсутність у людини будь-якого житла, призначеного та придатного для проживання (бездомність);

6) перебування у закладах охорони здоров'я з надання психіатричної допомоги;

7) перебування у закладах соціального захисту.

4. Критеріями віднесення особи до групи підвищеного ризику, пов'язаними з умовами праці є:

1) робота у виробничих умовах із впливом діоксиду кремнію (шахтарі, працівники металургійної галузі, гірничодобувної промисловості);

2) робота в слідчих ізоляторах, установах виконання покарань, інших місцях перебування засуджених осіб та осіб, взятих під варту ;

3) робота в закладах охорони здоров'я (медичні працівники);

4) військова служба.

5. Критеріями віднесення особи до групи підвищеного ризику, пов'язаними зі станом здоров'я є:

1) наявність ВІЛ-позитивного статусу;

2) наявність фіброзних залишкових змін у легенях у людей, які не отримували лікування від туберкульозу;

3) наявність захворювань, що призводять до ослаблення імунітету (злоякісні новоутворення, цукровий діабет);

4) отримання імуносупресивної терапії, отримання терапії інгібіторами ФНП-а;

- 5) наявність в анамнезі попереднього лікування туберкульозу;
- 6) наявність хронічних респіраторних захворювань, пневмонії;
- 7) наявність в анамнезі гастроектомії або шлунково-кишкового шунтування;
- 8) наявність хронічної ниркової недостатності;
- 9) наявність дефіциту харчування або індексу маси тіла менше 18.

6. Критеріями віднесення особи до групи підвищеного ризику, пов'язаними з фізіологічним станом є:

- 1) вік старше 60 років;
- 2) вагітність та післяпологовий період (3 місяці після пологів).

**В.о. директора Департаменту
громадського здоров'я**

Ігор ПОВОРОЗНИК